



Witte bloesem



Hanita



Tipala



Warwickshire Drooper

KWETSEN, KWETSPRUIMEN

1. ALGEMEEN

- Pruimen, waartoe ook de kwetsen horen komen van nature in Noord- en West-Azië, Japan, China en Zuid-Rusland voor.
- De meeste kwetsen zijn vooral afkomstig uit Duitsland.
- In het Duits wordt de vrucht Zwetschge of Zwetschke, in het Frans quetsche of prune de Damas genoemd. Bron: Wikipedia.

1.2 PLANTKUNDIGE KENMERKEN

- Het geslacht **Prunus** behoort tot de *Rosaceae* (rozenfamilie) en onderfamilie steenvruchten.
- De gewone Europese pruimen (*Prunus domestica*) heeft als ondersoort kwetsen (*Prunus domestica subsp. domestica*).
- De vruchten van kwetsen zijn langwerpig of ovaal (eivormig). Opvallend platte vruchtsteen (pit).

1.2 BLOEI EN BESTUIVING

FRUITABC.BE

[Home Fruit-ABC](#)[Teeltbeschrijvingen](#) ▼[Fruitnamen](#)[Nieuws](#) ▼[Weblinks](#) ▼[Contact](#)

-
- Ze zijn minder sappig, maar zoeter dan gewone (ronde) pruimen.
 - De steen (pit) is meestal tweedelig en bestaat uit een grote steen en een veel kleiner aanhangsel.

2. GROEI EN KEUZE ONDERSTAM

Meestal in openlucht en geschikt voor kleine en grote tuinen.

2.2 GROEVORM

- Meestal als boom (laagstam, halfstam, hoogstam), maar een grote struik is ook mogelijk.
 - Er zijn ook zgn kolomvormige pruimenrassen met een dwergachtige groei.
-

2.3 ONDERSTAM

- Meestal geënt verkocht.
 - Hoogstammen worden op de zeer sterk groeiende 'Brompton' veredeld.
 - Laagstammen en halfstammen/struiken worden veredeld op 'Saint Julien A'.
 - De onderstam *Prunus spinosa* 'Wur S766' ®, geeft een laagstamboom die ca 1/4 kleiner is dan op St Julien A.
 - De 'Hauszwetsche' wordt ook dmv wortelopslag vermeerderd en heeft dan geen onderstam nodig.
-

3. STANDPLAATS

3.1 LICHTBEHOEFTE

Kwetspruimen groeien het best op een zonnige plaats, maar verdragen ook halfschaduw.

3.2 BODEM

- Kwetspruimenbomen verdragen geen te natte grond, de groei laat dan te wensen over.
- Voorkeur voor een humusrijke grond.

4.1 TIJDSTIP

- Van november tot maart.
- Planten in pot kun je ook in april en mei nog planten.

4.2 AFSTAND

- Hoogstam op 8-10 m,
- halfstam 5-6 m en
- struikvormen en laagstamspil op (2) 2,5 tot 4 m.
- Zgn kolompruimen op 1 tot 1,5 m.

5. OPKWEKFASE (SNOEI)

5.1 TIJDSTIP

April. Tijdens of net voor de bloei snoeien.

5.2 WERKWIJZE

Verwijder te steile en te laag groeiende takken.
Lees meer in de Groente en Fruit Encyclopedie!

6.1 FREQUENTIE

Jaarlijks of om de twee jaar.

6.2 WERKWIJZE

- Snoei pruimenbomen en kwetsen vanaf half april tot eind september.
 - Sommige kenners snoeien net voor of tijdens de bloei. Anderen geven de voorkeur om te snoeien direct na de oogst.
 - Verwijder afgebroken takken, opslag en watertwijgen direct na de pluk.
 - Steil groeiende takken kunt u tijdens of direct na de oogst op een (kleine) stomp wegzagen.
 - Lees meer tips in de Groente en Fruit Encyclopedie!
-

7. RASSENKEUZE VOOR KWETSEN

- De meeste **nieuwe (moderne) kwetsrassen** zijn **beschermd** ®. en mag je niet vrij vermeerderen!
 - Zie ook rassenbeschrijving en bestuivingstabel van pruimen & kwetsen in de Groente en Fruit Encyclopedie!
-

7.1 ZEER VROEG RIJPEND (BEGIN JULI)

Ruth Gerstetter, **Juna** ®, Katinka® en Sanctus Hubertus.

7.2. MIDDENTIJDS RIJPEND (AUGUSTUS)

Felsina ®, Tegera, Tipala ®, Valor, Voyager, Warwickshire Drooper

7.3 LAAT EN ZEER LAAT RIJPEND (HALF/EINDE SEPTEMBER OF BEGIN OKT.)

Betuwse Kwets, Elena ®, Haganda ®, Hanita, **Haroma** ®, Presenta ®, Top®, ..

7.4 BLAUWE KWETSEN

Altesse Double de Liège (= Dubbele Bakpruim), Altesse Simple, Auerbacher Zwetsche, Betuwse Kwets, Cacaks Beste, Edda, Elena ®, Geisenheimer Top, Habella, Hanita ®, **Haroma** ®, **Joganta** ®, Jojo, **Juna** ®, Président (syn. Sultan), Prune de Namur, Sainte Cathérine, Stanley, Tipala ®, Valor, Wangenheim Frühzwetsche, ...

7.5 GELE OF GEELGROENE KWETSEN:

'Tipala' ®, 'Sainte Cathérine' en 'Warwickshire Drooper'

7.6 ZUILVORMIG GROEIENDE KWETSPRUIMEN (DWERG LAAGSTAMVORM):

- Aroma Spür ®, Fruca ® en Imperial ®.
 - Je kan ze op ca 1 of 1,5 meter van elkaar planten.
-

8. VERZORGINGSTIPS

8.1 BEMESTING

- Een te zwakke groei geeft kleine vruchten, mogelijk als gevolg van een tekort aan voedingsstoffen.
- Mest in het vroege voorjaar (maart) bij met organische meststoffen.
- De jaarlijkse scheutlengte moet minstens 20 cm zijn.

8.2 MULCHEN

- Mulchen kan je vanaf einde mei tot oktober doen.
- Maak tijdens de bloei de boomspiegel vrij van gras (en andere begroeiing) en mulch. Een zwarte, gesloten en vochtige boomstrook kan tijdens de bloei 2 tot 3 °C warmte uitstralen, zodat vorstschade aan de bloemen voorkomen wordt.

8.3 ZOMERSNOEI

Breek tijdens het vrucht dunnen (juni) de sterk groeiende rugscheuten weg.

9. OOGSTEN EN BEWAREN VAN KWETSPRUIMEN

9.1 OOGSTTIJD

- De vroegste rassen zijn rond begin/half juli rijp.
- De oudere (en sommige moderne) kwetspruimen rijpen pas vanaf half augustus tot september en ze kunnen na volledige rijpheid nog blijven hangen zodat ze nog zoeter worden.

9.2 AANDACHTSPUNT

- Pluk alleen rijpe vruchten af. Onrijp geplukte vruchten worden niet zoeter!
- Eet- en plukrijpe vruchten zijn mals, sappig en meestal zoet van smaak.

9.3 NA DE PLUK

- Licht gekwetste vruchten kan je best direct verwerken.
- Laat kippen scharrelen onder de bomen

9.4 GEBRUIK VAN KWETSEN

- Kwetspruimen zijn bijzonder geschikt voor wijnbereiding, destilleren, gebak (taart) en voor verwerking tot confituur/jam zonder (of met weinig) suiker. Ook geschikt om te drogen.
- De vruchten zijn zeer zoet, weinig sappig en meestal goed steen lossend.
- Hoewel ze minder sappig zijn dan andere pruimen, kunnen kwetsen ook gewoon vers gegeten worden.

10. MOGELIJKE PROBLEMEN

- Een groot aantal rassen is zeer geschikt voor liefhebbers, ze zijn meestal minder vatbaar voor schimmelziekten.
- Soms zijn enkele rassen toch gevoelig voor schimmelziekten: bacteriekanker, bladvlekkenziekte, hagelschotziekte, hongerpruimenziekte, loodglans, monilia vruchtrot en roest.
- Sporadisch komen er ook plagen voor: bladluizen, houtkevers, pruimenmot, pruimenzaagwesp, rupsen van de wintervlinder, schorsboorders en spint.
- Sommige (oude) rassen zijn vatbaar voor het Sharka-virus.

11. SAMENVATTING

- Kwetspruimen zijn gemakkelijk te kweken.
- De vroegste rassen zijn meestal rond half juli rijp, het seizoen eindigt meestal rond einde september of half oktober.
- De vruchten moeten boomrijp en bij voorkeur met steel worden geplukt. Voorzichtig behandelen is noodzakelijk.
- Er is slechts beperkte snoei nodig.

VRAAG

- **Heb jij de nieuwe kwetsen 'Haroma', 'Joganta' en/of 'Juna' staan?**

[Bewerk deze pagina »](#)

- **Haroma** ® en **Joganta** ® zijn te bekomen bij o.a. **CallePlant** te Wetteren.
- *Graag reageren via mail of [contactformulier](#).*
- *Alvast bedankt voor het delen van uw informatie!*



Elena



Tipala



Top



Warwickshire Drooper



Confituur/jam van Warwickshire Drooper (Bokalen niet omdraaien na het vullen!)

Opmaak: Guy De Kinder ©, december 2024

[Steenfruit](#)[Europese pruimen](#)[FB Liefhebbers van fruit en fruitteelt](#)[Contact](#)